

பூச்சுக்கொல்லிகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாடு



தேசிய நச்சுத் தகவல் மையம்
இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை
கொழும்பு

பூச்சுக்கொல்லிகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாடு

இலங்கையில் பூச்சுக்கொல்லிகள் பொதுவாக விவசாய நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பூச்சுக்கொல்லிகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாடு பற்றி அறிந்திருப்பது அத்தியாவசியமானதாகும்.


பூச்சுக்கொல்லியின் சரியான பயன்பாடு

கொள்வனவு செய்தல்

- ❖ விவசாய போதனாசிரியர் ஒருவரின் உதவியுடன் சரியான பூச்சுக்கொல்லியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ❖ ஒட்டுத்துண்டை வாசித்து காலாவதித் திகதி பற்றி கவனம் செலுத்தவும்.

போக்குவரத்து

- ❖ அதன் அசல் கொள்கலன்களில் எடுத்துச் செல்லவும்.
- ❖ கசியும் அபாயத்தைத் தவிர்க்கவும்.
- ❖ பயணிகள் பெட்டிகளில் அல்லது உணவுப் பொருட்களுடன் கொண்டு செல்லக்கூடாது.



களஞ்சியப்படுத்துதல்

- அசல் கொள்கலனில் சேமித்து வைக்கவும்
- அசல் ஒட்டுத்துண்டுளை அகற்ற வேண்டாம்.
- பூச்சுக்கொல்லிகளை ஒருபோதும் வெற்று உணவுக் கொள்கலன்களில் களஞ்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
- வெற்று பூச்சுக்கொல்லி கொள்கலன்களில் உணவை ஒருபோதும் களஞ்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
- உணவு மற்றும் குடிபானங்களுடன் ஒருபோதும் களஞ்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
- குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு வைக்கவும்.



- பூட்டிய இடத்தில் வைக்கவும்



பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர்
ஒட்டுத்துண்டையும்
அறிவுறுத்தல்களையும் வாசிக்கவும்.



கலத்தல்

- கலக்கும் போது இறப்பர் கையுறைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
- பூச்சிக்கொல்லிகளை கலக்கும் போது மரக்குச்சியைப் பயன்படுத்தவும்.



தெளித்தல்

- பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் உபகரணத்தின் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.
- மருந்து தெளிப்பதற்கு முன்னர் குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகளை அப்பகுதியிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.

- முழு உடலையும் மறைக்கும் வகையில் பாதுகாப்பான ஆடைகளைப் பயன்படுத்தவும்.



- பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை காற்றின் திசைக்கு செங்குத்தாகத் தெளிக்கவும்.



- மழை நாட்கள் அல்லது பலத்த காற்று அல்லது அதிக வெப்பமான காலநிலையுள்ள நாட்களில் தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
- வீட்டைச் சுற்றி தெளிக்கும் போது ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகளை மூடி வைக்கவும்.
- தெளிக்கும் போது ஒருபோதும் உண்ணவோ, குடிக்கவோ அல்லது புகைக்கவோ கூடாது.



பூச்சிக்கொல்லிகளைப்
பயன்படுத்துவதற்கு காலை
நேரமே சிறந்தது.

பூச்சிக்கொல்லிகளைக் கையாண்ட பின்னர்,

- உபகரணத்தை முறையாக சுத்தம் செய்யவும்.
- உபகரணங்களை சுத்தம் செய்யப் பயன்படுத்திய நீரை அருகிலுள்ள ஓடைகள் மற்றும் கிணறுகளுக்கு ஒருபோதும் வடிய விடாதீர்கள்.
- தெளிப்பதற்குப் பயன்படுத்திய ஆடைகளை தனியாகக் கழுவிவிட்டு குளிக்கவும் .

வெற்று கொள்கலன்களை அகற்றுதல்.

- மூன்று முறை நன்றாகக் கழுவிவிட்டு சேகரிக்கும் நிலையங்களுக்கு ஒப்படைக்கவும்.

அறுவடை காலம்: பூச்சிக்கொல்லிகளை
தெளித்த பின்னர் குறைந்தபட்சம் 14 நாட்கள்.

பூச்சிக்கொல்லிகளின் நச்சுத்தன்மை

ஒட்டுத்துண்டிலுள்ள எச்சரிக்கை குறியீடுகளுக்கேற்ப நச்சுத்தன்மையை அடையாளங்காண முடியும்.

முன்னெச்சரிக்கை - குறைவான நச்சுத்தன்மை
எச்சரிக்கை - மிதமான நச்சுத்தன்மை
அபாயம்- அதிக நச்சுத்தன்மை

Finding active ingredients on a pesticide label

Active Ingredients
Bifenthrin.....0.1%
Other Ingredients.....99.9%
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel booklet for additional
precautionary statements
NET WT 10 lb (4.53kg)

Pesticide labels show the active ingredient in a product.



பூச்சிக்கொல்லிகள் காரணமாக ஏற்படும் ஆரோக்கியக்கேடுகள் வெளிப்பாட்டின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் அளவு என்பவற்றில் தங்கியுள்ளன.

குறைந்தளவிலானதொரு நச்சுப்பொருள் கூட அதிகளவில் வெளியிடப்படும் பொழுது தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும்.

எவ்வாறு உடல்நலக்கேட்டைக் குறைப்பது

- பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும்
- முடிந்தவரை உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தவும்

நஞ்சுட்டப்பட்டால்,

நோயாளியை உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லவும்.




011-2686143 / 011-2691111

வி.தொ. 2430

தேசிய நச்சுத் தகவல் மையம்

இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை



மின்னஞ்சல் : npdic.nhs@gmail.com
infotoxlanka@gmail.com



<https://www.facebook.com/NTPICSL>

இணையத்தளம் <http://www.toxbaselanka.info>

சுகாதார அமைச்சின் அனுசரணையுடன் தேசிய நச்சுத் தகவல் மையத்தினால் வெளியிடப்பட்டது.